

MATERIAL COMPLEMENTARIO.

Tabla 3. Variables del estudio	
Variables demográficas	
Sexo	Riñón afectado
Localización tumoral	ASA
Peso	IMC
HTA	IRC previa
DM	Litiasis
Índice de Charlson	
Variables quirúrgicas	
Tipo de cirugía	Tiempo de la cirugía
Tiempo de isquemia	Aspirado
Transfusión	
Variables anatomopatológicas	
Presencia pseudocápsula	Grosor
Medición espesor (μm)	Invasión tumoral
Infiltrado inflamatorio	Necrosis
Vascularización	Fibrosis
Relación tejido circundante	Tipo histológico

Tabla 4. Variables demográficas		
	Número	%
Sexo		
Varón	44	53,7%
Mujer	38	46,3%
Riñón		
Derecho	39	47,6%
Izquierdo	43	52,4%
Localización		
Polo superior	27	35,5%
Mesorrenal	25	32,9%
Polo inferior	22	28,9%
Todo	2	2,6%
HTA	39	48,1%
IRC previa	16	19,5%
DM	11	13,6%
Litiasis	13	17,3%
Edad		
Media	65,7años	
Mediana	65 años	
IQR	19	
IMC		
Media	27,57 kg/m ²	
Mediana	26,6 kg/m ²	
IQR	6,54	
Índice de ASA		
ASA 2	48,6%	
ASA 3	32,9%	
Índice de comorbilidad de Charlson		
Media	3,44	
Mediana	3	
IQR	2	

Tabla 5. Variables quirúrgicas		
	Número	%
Tipo de cirugía		
Radical	74	90,2
Parcial	8	9,8
Abordaje quirúrgico		
Abierta por lumbotomía	3	3,8
Abierta transperitoneal	8	10
Laparoscopia transperitoneal	63	78,8
Laparoscopia retroperitoneal	1	1,3
Robótica transperitoneal	4	5,0
Robótica retroperitoneal	1	1,3
Tiempo quirúrgico		
Media	136,2 minutos	
Mediana	130 minutos	
IQR	60	
Sangrado (aspirado)		
Media	151,31 ml	
Mediana	100 ml	
IQR	29	
Transfusión (CH)	7	8,5%
Tiempo de isquemia		
Media	17 minutos	
Mediana	18 minutos	
IQR	13	

Tabla 6. Variables anatomopatológicas de la pseudocápsula tumoral		
	Número	%
Presencia de pseudocápsula	54	65,9
Invasión tumoral		
Sin invasión	12	14,6
Desconocido	31	37,8
Invasión focal	28	34,1
Invasión extensa	11	13,4
Infiltrado inflamatorio	33	40,2
Necrosis	3	3,7
Vascularización	12	14,6
Fibrosis		
Sí, desorganizada	29	35,4
Sí, organizada	19	23,2
No	34	41,5
Relación tejido circundante		
Destruye tejido	27	32,9
Preserva tejido	55	67,1
Tipo histológico		
Angiomiolipoma	12	14,6
Células claras	38	46,3
Cromóforo	11	13,4
Oncocitoma	10	12,2
Papilar	11	13,4