RELACIÓN DEL TELOPÉPTIDO CARBOXITERMINAL DEL COLÁGENO TIPO
I SÉRICO CON LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA Y EL CONSUMO DE
FÁRMACOS EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS. DATOS PRELIMINARES
DEL ESTUDIO FRODOS.

José M. Olmos, Josefina Martínez, José L. Hernández, J González-Macías.

Departamento de Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Universidad de Cantabria. RETICEF. Santander.

José M. Olmos

Departamento de Medicina Interna

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Avda. Valdecilla s/n

39008-Santander

Spain

Fax: +34942202508

e-mail: miromj@humv.es

1 Sr. Director:

2 Hemos leído con interés el trabajo publicado por Kanterewicz et al (1), en que
3 describen los valores del marcador de resorción ósea β -CTXs, determinado por
4 electroquimioluminiscencia (Elecsys 2010, Roche Diagnostic), en una cohorte
5 de 1495 mujeres de 59-71 años (media de edad 65) de la comarca de Osona,
6 en Cataluña. En su introducción hacen referencia a la escasez de este tipo de
7 estudios en España. Ya que nosotros hemos estudiado este mismo marcador
8 en otra cohorte reclutada en Cantabria, con resultados básicamente similares
9 (2), nos ha parecido interesante insistir en dicha similitud, dadas las
10 discrepancias que ofrecen con otros datos publicados previamente, y
11 considerados como punto de referencia.
12

13 Nuestro estudio se ha desarrollado en 1080 mujeres posmenopáusicas,
14 ninguna de las cuales había sido diagnosticada de osteoporosis, ni recibía
15 (aunque no hubiera sido diagnosticada formalmente) tratamiento para dicha
16 enfermedad, ya que ambos aspectos se consideraron criterios de exclusión. La
17 media de edad fue de 63 años, con un rango de 44-93. En el estudio de
18 Kanterewicz et al, la media de edad fue similar (65 años), pero el rango menor
19 (59-71). El diseño también fue algo diferente, ya que en su serie no se excluyen
20 las mujeres diagnosticadas o tratadas de osteoporosis, aunque en el análisis
21 de los resultados distinguen diferentes subgrupos de mujeres de acuerdo con
22 ambas circunstancias.
23

24 El valor medio de β -CTXs en las mujeres de nuestro estudio fue de
25 $0,387 \pm 0,197$ ng/ml. Si se excluye el 20% de ellas en que se encontraron
26 valores densitométricos de osteoporosis, la cifra desciende ligeramente, a
27 $0,374 \pm 0,197$ ng/ml; en el 20% de mujeres osteoporóticas la cifra fue de
28 $0,438 \pm 0,187$. En nuestro grupo de mujeres premenopáusicas utilizadas como
29 referencia, seleccionadas aleatoriamente entre mujeres de 26-50 años, la cifra
30 fue de $0,271 \pm 0,139$ ng/ml.
31

32 En la cohorte catalana, el valor medio de β -CTXs del conjunto de las
33 mujeres no osteoporóticas, calculado a partir de los datos que ofrecen los
34 autores separadamente para mujeres con osteopenia y con densidad ósea
35 normal, es de 0,408 ng/ml, aceptablemente próximo a los 0,374 ng/ml de las
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 mujeres no osteoporóticas de nuestra cohorte. Por otra parte, los valores que
2 señalan Kanterewicz et al en su grupo de referencia premenopáusico son de
3 0,305±0,150 ng/ml, también muy similares a los nuestros. En las mujeres
4 osteoporóticas no tratadas del estudio de Osona, la cifra media del marcador
5 fue de 0,523 ng/ml, claramente superior a los 0,438 ng/ml de nuestro estudio;
6 pero lógicamente, es muy difícil comparar dos poblaciones osteoporóticas sin
7 conocer otras características de las mismas.
8

9 La proximidad entre los datos de Kanterewicz et al y los nuestros propios
10 merece particular atención por las grandes diferencias que presentan con las
11 cifras publicadas por Garnero et al (3) en la cohorte OFELY, en Francia, de
12 acuerdo con las cuales los valores propios de las mujeres posmenopáusicas se
13 sitúan en 0,556±0,226 ng/ml, muy por encima de los nuestros. La autoridad
14 científica del laboratorio francés, y el amplio reconocimiento de que goza en el
15 ámbito científico mundial, pueden llevar a que las cifras señaladas se
16 consideren como punto de referencia universalmente válido. Sin embargo,
17 nuestros datos, junto a los de otros autores (4-7), sugieren que puede existir
18 una marcada variabilidad en las cifras de normalidad (relacionada bien con
19 aspectos genéticos o con hábitos de vida, etc), por lo que es aconsejable que
20 cada país, e incluso cada región, establezca sus propios valores de referencia
21 antes de interpretar los resultados de la determinación de este marcador de
22 resorción ósea.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49 BIBLIOGRAFÍA:

- 50 1. Kanterewicz E, Puigoriol E, Peris P, del Río L, Rosique P, Yáñez A, et al.
51 Relación del telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo I sérico con la
52 densidad mineral ósea y el consumo de fármacos en mujeres
53 posmenopáusicas. Datos preliminares del estudio FRODOS. Med Clin
54 (Barc) 2009; 133: 609-614.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2. Martínez J, Olmos JM, Hernández JL, Pinedo G, Llorca J, Obregón E, et al. Bone turnover markers in Spanish postmenopausal women. The Camargo cohort study. Clin Chim Acta 2009; 409: 70-74.
3. Garnero P, Borel O, Delmas PD. Evaluation of a fully automated serum assay for C-terminal cross-linking telopeptide of type I collagen in osteoporosis. Clin Chem 2001; 47: 694-702.
4. Trento LK, Pietriopoli A, Ticconi C, et al. Role of type I collagen C telopeptide, bone-specific alkaline phosphatase and osteocalcin in the assessment of bone status in postmenopausal women. J Obstet Gynecol Res 2009; 35: 152-159.
5. Lenora J, Ivaska KK, Obrant KJ, Gerdhem P. Prediction of bone loss using biochemical markers of bone turnover. Osteoporos Int 2007; 18: 1297-1305.
6. Chen JS, Camero IA, Cumming RG, et al. Effect of age-related chronic immobility on markers of bone turnover. J Bone Miner Res 2006; 21:324-331.
7. Glover SJ, Gall M, Schoenborn-Kellenberger O, Wagener M, Garnero P, Boonen S, et al. Establishing a reference interval for bone turnover markers in 637 healthy, young, premenopausal women from the United Kingdom, France, Belgium, and United States. J Bone Miner Res 2009; 24: 389-397.